


TRABAJO PRACTICO N° 12

QUÍMICA ORGÁNICA

1. Escribir la fórmula semidesarrollada de los compuestos siguientes:


a) 2,3,5-trimetil-4-propilheptano



(*) no se muestran los carbonos 2,3,4 y 5 de la cadena principal.

Se debe tener presente que de cada carbono deben salir 4 enlaces totales.

b) 4-etil-1,1-dimetiloctano




El compuesto no está nombrado de acuerdo con las reglas de IUPAC. Al incorporar un grupo metilo en un extremo de la cadena principal se alarga la cadena, que pasa a tener 9 carbonos.

El nombre sería entonces: 5-etil-2-metil-nanano

(*) no se muestran los carbonos 2 y 5 de la cadena principal.

Se debe tener presente que de cada carbono deben salir 4 enlaces totales.

c) 2-metilciclohexano




El localizador 2 no debe aparecer cuando el ciclo tiene una sola sustitución.
El nombre del compuesto debería ser metilciclohexano ó 1-metilciclohexano

Cuando hay un solo grupo sustituyente en un ciclo, ese carbono se convierte automáticamente en el carbono 1

(*) El ciclohexano está representado por la fórmula de esqueleto, en la que cada vértice indica a cada uno de los carbonos que forman el ciclo y se sobreentiende que cada carbono completa sus 4 enlaces con H

d) ácido *p*-nitrobezoico




La presencia de la letra ***p*** en el nombre del compuesto está indicando que se trata de un benceno disustituido, es decir un anillo bencénico al que se le han unido dos grupos.

p representa al prefijo ***para*** que indica que la distancia entre los dos grupos es la máxima posible.


Los grupos que se unen al benceno son: un grupo nitro(-NO₂) y un grupo carboxilo (-COOH)

e) 1,2-etanodiol



La cadena de carbonos está representada por la fórmula de esqueleto


f) 3-heptanona



(*) No se muestra el carbono que forma el grupo carbonilo

Las cetonas también pueden ser nombradas indicando el nombre de las cadenas que se encuentra a ambos lados del grupo carbonilo e indicando la presencia del grupo carbonilo con la palabra cetona. En este caso:
butiletilcetona

g) 2-propilpentanal




(*) Cuando el compuesto tiene un grupo funcional, la base del nombre va a estar dada por la cadena de carbono más larga que contenga al grupo funcional.

2. De un nombre según IUPAC a los siguientes compuestos:

a) CH₃CHO

Los compuestos están representados por fórmulas condensadas, es conveniente desplegar los enlaces químicos para tener mayor información antes de nombrarlos:




Al distribuir los elementos en la estructura podemos observar que el compuesto presenta un grupo carbonilo terminal, por lo tanto se trata de un aldehído. Que siguiendo las reglas de IUPAC se nombraría como:

ETANAL



Primero, pasamos de fórmula condensada a fórmula desarrollada:




(*) No se muestra el carbono que forma el grupo carbonilo
Identificamos la cadena de carbonos más larga que contiene al grupo funcional. En este caso es de 4 carbonos. El carbono 1 es el carbono del grupo carbonilo, debemos mencionar en el nombre que en el carbono 3 se localiza un grupo metilo. Siguiendo las reglas de IUPAC el nombre del compuesto es:

3-metilbutanal



Primero, pasamos de fórmula condensada a fórmula desarrollada:




(*) No se muestra el carbono 1 y 2 de la estructura.
De acuerdo con las reglas de IUPAC el nombre del compuesto es:

2-cloropentanal




Primero, pasamos de fórmula condensada a fórmula desarrollada:




(*) No se muestra el carbono 2 de la estructura.

Como el grupo carbonilo (-C=O) se encuentra en el medio de una cadena de carbonos se trata de una cetona, que de acuerdo con las reglas de nomenclatura se nombra:

3-metil-2-butanona




Primero, pasamos de fórmula condensada a fórmula desarrollada. Debemos tener en cuenta que cuando una parte de la fórmula está indicada como fórmula molecular (C_6H_5) está representando un ciclo. Por la cantidad de carbonos e hidrógenos se trata de un anillo bencénico.




(*) No se muestra el carbono que forma el grupo carbonilo

Podemos nombrar a este compuesto como:

Etil fenil cetona ó 1-fenil-1-propanona



Primero, pasamos de fórmula condensada a fórmula desarrollada.



De acuerdo con las reglas de nomenclatura podemos nombrar a este compuesto como:


3-buten-2-ona ó Metil vinil cetona

3. Escribir todos los isómeros posibles del pentanol (Alcohol Amílico)


Asignarles nombre y clasificarlos según:

a) la isomería de cadena


En la isomería de cadena se realizan modificaciones en la disposición de los átomos de carbono e hidrógeno sin modificar la posición del grupo -OH




1-pentanol



3-metil-1-butanol




2-metil-1-butanol




2,2-dimetil-1-propanol

b) la isomería de posición


En la isomería de posición se cambia la posición del grupo -OH sin modificar la disposición de los átomos de C e H:



1-pentanol



2-pentanol




3-pentanol


c) el tipo de función alcohólica

Un alcohol puede ser primario, secundario ó terciario, dependiendo de la cantidad de carbonos que estén unidos al carbono que está unido al grupo -OH:


Alcohol primario: el carbono que está unido al grupo -OH está unido a un carbono. En este caso serían alcoholes primarios:




1-pentanol



3-metil-1-butanol




2-metil-1-butanol




2,2-dimetil-1-propanol

Alcohol secundario: el carbono que está unido al grupo -OH está unido a dos carbonos. En este caso serían alcoholes secundarios:




2-pentanol



3-pentanol

Alcohol terciario: el carbono que está unido al grupo -OH está unido a tres carbonos. En este caso, un isómero del 1-pentanol que sea alcohol terciario sería:




2-metil-2-butanol

4. Nombrar los siguientes compuestos y marcar con x los polialcoholes:

a) ~~CH₃CHOHCHOHCH₃~~

Primero, pasamos de fórmula condensada a fórmula desarrollada.




2,3-butanediol

La presencia de dos grupos -OH hace que este compuesto sea clasificado como un polialcohol.

b) CH₂OH(CH₂)₄CH₃

Primero, pasamos de fórmula condensada a fórmula desarrollada.




1-pentanol

Se trata de un alcohol.

c) ~~CH₂OH(CHOH)₄CH₂OH~~


Primero, pasamos de fórmula condensada a fórmula desarrollada.



1,2,3,4,5,6-hexanohexaoxane

La presencia de seis grupos -OH hace que este compuesto sea clasificado como un polialcohol.

d) CH₃CHOHCOOH




Ácido 2-hidroxi-1- propanoico

Uno de los grupos -OH corresponde al grupo carboxilo, que le da al compuesto propiedades de ácido y no de alcohol. Este compuesto no debe ser clasificado como un polialcohol.


- e) Con los prefijos sec y ter se determina si el alcohol es secundario o terciario, respectivamente. Escribir la fórmula desarrollada del sec-butanol y ter-butanol. ¿Son isómeros? ¿Cuáles son sus nombres según IUPAC?

sec-butanol C₄H₁₀O



2-butanol

ter-butanol C₄H₁₀O




2-metil-2 propanol

Ambos compuestos comparten la misma fórmula molecular, por lo tanto, son isómeros


5. Escribir la fórmula desarrollada de dos éteres, ambos con 6 átomos de carbono en su molécula, siendo uno de ellos simple y el otro mixto. Nombrar ambos compuestos.

Un éter es simple cuando la cadena de carbonos es la misma a ambos lados del átomo de oxígeno.




Nombres posibles: **Dipropil éter éter dipropílico propano-oxi-propano**

Un éter es mixto cuando las cadenas de carbono a ambos lados del átomo de oxígeno son de diferente longitud. Tenemos dos opciones de éteres mixtos con 6 átomos de carbono:



Nombres posibles: **Butiletíl éter** **éter butiletílico** **butano-oxi-etano**



Nombres posibles: **metilpentiléter** **éter metilpentílico** **metano-oxi-pentano**

6. Metano-oxi-propano y éter dietílico son denominaciones correspondientes a:

- la misma sustancia
- distintas sustancias
- isómeros
- isómeros de cadena
- isómeros funcionales

Comenzamos por escribir la fórmula desarrollada de ambos compuestos:




Como ambos compuestos comparten la misma fórmula molecular, ambos compuestos son **isómeros**.


La diferencia en estos dos compuestos está en la posición del átomo de oxígeno, por lo tanto, se clasifican como **isómeros de posición**

7. Escribir la fórmula desarrollada de:

a) propanal




b) m-cloro-benzaldehido




c) formaldehido


El formaldehido es el aldehído más simple, que según las reglas IUPAC su nombre es **metanal**:



d) una cetona simétrica y otra asimétrica, ambas de 7 átomos de carbono.




Cetona simétrica: **4-heptanona ó dipropil cetona**



Cetona asimétrica: **2-heptanona ó metilpentilcetona**

e) Difenil-cetona




8. La metil-butanona y la 2-pantanona son isómeros de:


a) Cadena

- b) Posición
- c) cadena y posición
- d) todas las respuestas son correctas

Para poder clasificar a estos compuestos comenzamos por escribir la fórmula desarrollada de cada uno:



3-metil-2-butanona




2-pentanona

En ambos compuestos el grupo carbonilo se encuentra ubicado en el carbono 2, la diferencia entre ambos compuestos está en la disposición de los átomos en la cadena de carbono, por lo tanto, se clasifica a estos compuestos como:

a) isómeros de cadena


9. Escribir las fórmulas desarrolladas y los nombres de los siguientes ácidos, de acuerdo con las características que para cada uno de ellos se indica:

- a) ácido cáprico: monocarboxílico, con cadena normal de 10 átomos de carbono




Nombre según las reglas de IUPAC: Ácido decanoico

- b) ácido caproico: monocarboxílico, con cadena normal de 6 átomos de carbono




Nombre según las reglas de IUPAC: Ácido hexanoico

- c) ácido adípico: dicarboxílico, también con cadena normal de 6 átomos de carbono




Nombre según las reglas de IUPAC: Ácido 1,6-hexanodioico

- d) ácido cinámico: anillo bencénico, con cadena lateral de 3 átomos de carbono en la cual hay un doble enlace entre átomos de carbono y un carboxilo.




Nombre según las reglas de IUPAC: Ácido 3-fenil-2-propenoico

- e) ácido glicérico: obtenido por oxidación de una de las funciones alcohólicas primarias de la glicerina.




Nombre según las reglas de IUPAC: Ácido 2,3-dihidroxipropanoico

- f) ácido crotónico: monocarboxílico, con cadena de 4 átomos de carbono, con doble ligadura central.



Nombre según las reglas de IUPAC: Ácido 2-butenoico

- g) ácido mandélico: en la cadena lateral, de dos átomos de carbono, de un anillo bencénico, hay una función alcohol y una función ácido.



Nombre según las reglas de IUPAC: Ácido 2-fenil-2-hidroxietanoico

10. Dadas las sustancias caracterizadas por las fórmulas moleculares:

a) CH₂OH—CHOH—CHOH—COOH

b) CH₂OH—CH=CH—CH₂OH



c) CH₃—COH=COH—CH₃

d) CH₃—C≡C—CH₃


¿Cuáles evidenciarán isomería geométrica del tipo cis-trans? Marcar con una x.
Fundamentar la respuesta, expresando los requisitos indispensables para que exista la isomería geométrica.

Para que un compuesto presente isomería geométrica del tipo cis-trans debe contar con por lo menos un enlace doble entre carbonos. Como los compuestos a) y d) no cuentan con doble enlace entre carbonos, no van a presentar isomería del tipo cis-trans


Los compuestos b) y c) son los que pueden evidenciar isomería del tipo cis-trans:




Cis- 2-buten-1,4-diol




Trans- 2-buten-1,4-diol





Cis 2-buten-2,3-diol




Trans 2-buten-2,3-diol


Ejercicios complementarios:

1. Dibuje todos los isómeros posibles para la molécula: C₄H₈. Nómbralos.


De acuerdo con la fórmula molecular la fórmula general del compuesto sería: C_nH_{2n} que corresponde a un alqueno ó un cicloalcano.




1-buteno



2-buteno




ciclobutano




2-metil-1-propeno

2. Escriba la fórmula desarrollada de:

- a) 3,3-dimetilpentano




- b) 1,3-diethylciclohexano



3. De un nombre según IUPAC a los siguientes compuestos:





Comenzamos por escribir la fórmula desarrollada del compuesto:



Como el compuesto tiene un grupo carbonilo terminal, se trata de un aldehído, la cadena de carbonos es de 3 carbonos, por lo tanto, el nombre del compuesto es:

propanal





pentil-3-amina pentan-3-amina 3-pentilamina


3. Dada la fórmula $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$. Escribir la fórmula desarrollada de 2 isómeros de función, y nombrarlos.

Un isómero de función comparte la misma fórmula molecular pero presenta un grupo funcional distinto.


De acuerdo con la fórmula molecular del compuesto, se trata de un alcohol ó un éter. Los alcoholes comparten la misma fórmula general que los éteres, es decir que los éteres son isómeros de función de los alcoholes. En este caso:



4. Escribir la fórmula desarrollada de: a) 1,3-Diamino-2-clorohexano




c) Trifenol vecinal



6. De un nombre según IUPAC a los siguientes compuestos:


a) CH₃CH₂CH=CHCH₂CH₂COOH

Comenzamos por escribir la fórmula desarrollada del compuesto:




b) CHO(CH₂)₆CHO

Comenzamos por escribir la fórmula desarrollada del compuesto:




1,8-octanodial

7. Escriba la fórmula desarrollada de una amina secundaria cuya fórmula molecular es: $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{NH}$
Nómbrela.



Dietilamina

8. Escriba la fórmula desarrollada de un alcohol terciario cuya fórmula molecular es: $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$. Nómbrelo.




2-metil-2-propanol

TRABAJO PRACTICO N° 12

Ejercicios propuestos

- Escribir la fórmula desarrollada de los compuestos siguientes:
 - 2,3,3-trimetil-1,4,6-octatrieno
 - 5,6,7-tricloro-4,4-dietil-2,3-dimetilnonano
 - 1-etil-2-metilciclobutano
 - ácido m-nitrobenzoico
 - 1,2-etanodiol
 - 2-heptanona
 - Ácido etanoico
- De un nombre según IUPAC a los siguientes compuestos:
 - CH_3OH
 - CH_3COOH
 - $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CN}$
 - $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COCH}_3$
 - $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHBrCHBrCH}_3$
 - $\text{H}_2\text{C}=\text{CHOCH}_2\text{CH}_3$
 - $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3$
- Escribir las formulas desarrolladas y nombrar todos los hidrocarburos aromáticos del isómero C_8H_{10}



- Escribir las formulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos y la de sus isómeros:
 - 3-pentanol
 - 1-butanol
 - Dipropileter
 - Alcohol secundario de formula $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$
- Nombrar el compuesto $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH(Cl)CH}_3$. Escribir la fórmula de un isómero de cadena y uno de posición, y nombrarlo.
- Nombrar dos isómeros de función de $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$.

7. Nombrar los compuestos y decir ¿cuáles de los compuestos son isómeros entre si y que tipo de isomería presenta?

- a) $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{NH}_2$
- b) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CONH}_2$
- c) $\text{CH}_2\text{OHCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{OH}$
- d) $\text{CH}(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{NH}_2$
- e) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$

8. ¿Qué tipo de isomería presentan los compuestos etanol y éter metílico?

- a) Posición
- b) Función
- c) Óptica
- d) Geométrica

9. Escribir los nombres de compuestos

